



Désinfection régulière

SEGMENT : PISCINE RÉSIDENTIELLE

EASYCLIC®

Diffuseur flottant de chlore stabilisé

Pour une piscine de 30 à 60 m3

BÉNÉFICES PRODUIT

29/01/2016

TRAITEMENT COMPLET CHOC ET MULTI-ACTIONS
DÉSINFECTION CHOC
DÉSINFECTION RÉGULIÈRE
ANTI-ALGUES
CLARIFIANT

CARACTÉRISTIQUES

• Stabilisation élevée contre l'action destructrice des rayons ultra-violet de la lumière solaire • Compatible avec tout équipement de filtration • Non-comburant au transport, au stockage et à la manipulation • Ne contient pas de cuivre • Diffuseur flottant autonome, très simple d'utilisation • Dissolution totale sans résidu • Teneur élevée en matière active • Action désinfectante choc et longue durée • Action algicide renforcée • Convient pour toutes les eaux, même très dures • Action clarifiante • Action oxydante

MODE D'EMPLOI

1 - Ajuster le pH entre 7,0 et 7,4. Par la suite, effectuer cette opération au moins une fois par semaine
2 - Retirer l'étiquette plastifiée en découpant selon les pointillés, à l'endroit indiqué par la flèche. Conserver l'étiquette afin de pouvoir s'y reporter si nécessaire.
3 - Tourner la partie bleue du diffuseur flottant afin de sélectionner la taille d'ouverture correspondant au volume de la piscine. Choisir la taille d'ouverture correspondant au volume de votre piscine :
Taille n°1 (trou le plus petit) pour piscine de 30 m3 : jusqu'à 3 mois de traitement
Taille n°2 (trou intermédiaire) pour piscine de 40 m3 : jusqu'à 2 mois de traitement
Taille n°3 (trou le plus grand) pour piscine de 60 m3 : jusqu'à 1 mois de traitement
4 - Placer le diffuseur flottant directement dans le bassin, en l'absence de baigneurs. Le flotteur bascule sur le flanc lorsqu'il est vide ; utiliser alors un nouveau flotteur pour continuer le traitement.

Suivant les conditions de traitement (trou sélectionné, température de l'eau, temps de filtration, temps d'utilisation dans le bassin...), la dissolution des produits contenus dans le diffuseur flottant peut varier de +/- 2 semaines.

Il est possible de traiter une piscine de plus de 60 m3 ; pour cela, utiliser deux flotteurs et régler leur taille d'ouverture sur le volume correspondant à la moitié du volume totale du bassin.
Ne jamais placer le flotteur dans le skimmer.

*La durée de traitement de ce produit est donnée à titre indicatif sur la base d'une eau aux caractéristiques standards; celle-ci peut varier face à des valeurs de pH, de TAC ou de température décalées de la normale.

COMPOSITION

• Contient du symclosène (> 720 g/kg) et du dihydrate de dichloroisocyanurate de sodium (> 100 g/kg)

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

• Ne pas placer le flotteur dans un skimmer. Avant la baignade, le placer dans un seau propre contenant 10 litres d'eau tenu à l'écart des baigneurs. Après la baignade, transférer le diffuseur et le contenu du seau dans le bassin. Conservation au sec, dans un endroit bien ventilé, à une température moyenne journalière n'excédant pas 35°C.

Attention



Acute Tox. 4 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3

• Nocif en cas d'ingestion. • Provoque une sévère irritation des yeux. • Peut irriter les voies respiratoires.



Aquatic Chronic 1

• Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.